MADURAPRO®

Hoja Técnica 23649

Fecha: 09/07/2018
Versión: 04
Elaborado por: JTM
Aprobado por: JT

1. DENOMINACIÓN:	**MADURAPRO®** es un anticoccidial ionóforo monovalente glicósido, utilizado para la prevención y tratamiento de coccidiosis en aves.
2. COMPOSICIÓN:	Cada 100 g de MADURAPRO® contiene: Maduramicina de amonio 1 g Excipientes c.s.p. 100 g
3. FORMA FARMACÉUTICA:	Polvo en alimento.
4. DATOS CLÍNICOS:	
4.1. Especie de Destino	Aves (ponedoras y reproductoras en fase de levante, pollos y pavos de carne).
4.2. Indicaciones de uso	**MADURAPRO®** está indicado para el control y tratamiento efectivo de la coccidiosis en aves, causado por *Eimeria tenella, E. máxima, E. acervulina, E. necatrix, E. brunetti* y *E. mitis.*
4.3. Contraindicaciones	No utilizar en reproductoras o ponedoras en fase de producción.
4.4. Precauciones especiales de uso	Mezclar bien con el alimento para asegurar la distribución homogénea. Proteger el empaque de daños físicos. No utilizar en especies no indicadas. No exceder la dosificación recomendada.
4.4.1. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales	
Emplear las normas de seguridad industrial (Uso de anteojos, mascarilla, guantes, etc.). Si se produce contacto accidental con los ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Lavarse las manos minuciosamente luego de manipular el producto. La inflamación de la piel, labios, ojos o dificultad respiratoria son signos graves, requieren atención médica urgente. Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente.	
4.5. Reacciones adversas	No se han reportado.
4.6. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción	
No se han reportado.	
4.7. Posología y modo de administración	Administración vía oral, mezclado con el alimento.
• **Pollos y pavos de carne:**	Administrar a razón de 500 g/t de alimento.
• **Ponedoras y reproductoras en levante:**	Administrar a razón de 500 g/t de alimento hasta la cuarta semana y 350 g/t de alimento desde la quinta hasta la decimosegunda semana.
4.8. Sobredosis	Dosis mayores a las recomendadas pueden interferir con la ganancia de peso.
4.9. Periodo de retiro	5 días.
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:	
5.1. Mecanismo de acción	

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de Gestión de Calidad – Montana S.A.
Copias electrónicas son permitidas sin firmas sólo en el Portal de Información Técnica y una vez impresas son consideradas copias no controladas.

La maduramicina de amonio afecta el transporte de cationes a través de las membranas biológicas. Los iones monovalentes como el sodio (Na^+) y el potasio (K^+) son transportados, generando así los desequilibrios iónicos en el interior de la célula. Se produce un trastorno en la función de la membrana del parásito que no afecta a la célula huésped. Esta alteración conduce a una interrupción del metabolismo del parásito y finalmente, a su muerte. Actúa sobre las primeras fases de vida de los coccidios (esporozoíto a trofozoíto y sobre la primera generación de esquizontes).	
6. DATOS FARMACEUTICOS:	
6.1. Incompatibilidades	No se han reportado.
6.2. Tiempo de vida útil	24 meses.
6.3. Precauciones de almacenamiento	Debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, a una temperatura controlada entre 15º - 30ºC, protegidos de la luz UV y humedad. Mantener el empaque cerrado cuando no esté en uso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
6.4. Naturaleza y presentación del envase	Bolsa de papel/plástico (capas de papel externas y una capa interna de plástico PEAD) por 25 kg .
6.5. Precauciones especiales para la eliminación del producto no utilizado o productos de desecho	Cualquier producto veterinario no utilizado o material desechado procedente del producto debe ser destruido de acuerdo con las normativas locales de manejo de residuos.
7. Reg. SENASA N°:	F.08.04.N.0458

La información contenida en este documento es considerada confiable. Sin embargo, se provee esta información sin ninguna garantía expresa o implícita de su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenaje, uso o eliminación de este material están fuera de nuestro control; por lo tanto, no asumimos la responsabilidad en casos de daño, pérdida o gastos relacionados con tales actividades.
Este documento ha sido elaborado y debe ser usado para este material. Si el material es usado como ingrediente en otro producto, esta información no será aplicable para el producto resultante. Esta información no constituye una especificación técnica.

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de Gestión de Calidad – Montana S.A.
Copias electrónicas son permitidas sin firmas sólo en el Portal de Información Técnica y una vez impresas son consideradas copias no controladas.