MEDIDAS: 27.5 CM X 14.5 CM
FEBRERO 2020
AG

PANTONE 302 C | PANTONE 375 C | PANTONE PROCESS BLACK PC

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES
Mandarina, Lima, Limón, Palto y Mango	0.5 – 1	5 - 10	Aplicar durante la prefloración, floración e inicio de amarre de frutos.
Vid		3 - 6	Aplicar desde el desarrollo del brote hasta la floración.
Manzano y Durazno		3 – 5	Aplicar desde el hinchado de yemas, brotamiento, floración y cuajado de frutos.
Espárrago		1 – 3	Aplicar durante el almácigo, en el trasplante hasta la apertura de los filocladios.
Café y Cacao	1	1 – 2	Aplicar desde el brotamiento hasta el cuajado de los frutos.
Algodón y Maíz			Aplicar desde la emergencia hasta la etapa de prefloración.
Fresa y Arándanos		2 – 3	Aplicar desde el trasplante hasta el cuajado de los frutos
Alverja, Holantao, Vainita,Frejol, Pallar			Aplicar desde el inicio de la floración hasta el cuajado de los frutos.
Ajo y Cebolla			Aplicar desde el trasplante hasta el inicio del bulbeo
Papa y Camote			Aplicar desde la emergencia hasta el desarrollo de los tubérculos.
Arroz			Aplicar después del trasplante, durante el macollamiento y punto de algodón.
Pimientos, Ajíes, Tomate			Aplicar después del trasplante hasta el cuajado de los frutos.
Hortalizas de Hoja			Aplicar después del trasplante y durante el desarrollo vegetativo.
Brócoli y Coliflor			Aplicar después del trasplante hasta el inicio de la formación de la inflorescencia.
Zapallo, Sandía, Melón			Aplicar desde la emergencia de plantas, floración y cuajado.

CONSIDERACIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN

- **Agite bien el envase antes de usar.**
- Colocar agua en el tanque hasta la mitad.
- Agregue la cantidad necesaria de **FLORIPHOS**, previamente diluida en forma homogénea y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.
- Prepare la solución de **FLORIPHOS** el mismo día de la aplicación.
- No almacene el producto diluido en agua.

Floriphos

INDUCTOR DE LA FLORACIÓN Y DESARROLLO RADICULAR

Composición (p/v):

Fósforo (P_2O_5) 50%
Zinc (ZnO)..... 1.6%
Acomplejado con aminoácidos y EDTA.

Formulado y Distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este Nº 6210, Oficina 401, La Molina, Lima - Perú
Servicio de atención al cliente: (511) 419 3030
info@corpmontana.com / www.corpmontana.com

Lote:
Fecha de Form:
Fecha de Venc:

RECUADRO SIN BARNIZ (NO IRA IMPRESO)

Cont. Net. 1L

MONTANA

LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

GENERALIDADES

FLORIPHOS es un fertilizante foliar líquido estable que contiene una alta concentración de fósforo soluble, enriquecido con Zinc, muy fácilmente absorbible y de buena adhesión a la mayoría de los tipos de tejidos vegetales.

FLORIPHOS debe ser aplicado en forma complementaria a la fertilización mineral al suelo o cuando la absorción de fósforo resulte ineficiente debido a factores edáficos adversos, como lo que ocurre con la formación de fosfatos de calcio debido a la reacción entre el fósforo con el Calcio en medios alcalinos (pH mayor a 7).

VENTAJAS DEL USO DE FLORIPHOS

- Estimula el crecimiento vegetativo y el desarrollo radicular en etapas iniciales del cultivo.
- Incentiva las yemas florales y fortalece los órganos reproductivos (tubo polínico), asimismo mejora la viabilidad del polen y el cuajado de frutos.
- Participa en mejorar la formación y la germinación de las semillas.
- Mejora la calidad de frutas y hortalizas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de fertilizantes y productos fitosanitarios sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad cuando se desconozca su reacción o consultar con nuestro Departamento Técnico.

PRECAUCIONES

- Antes de usar este producto, leer las precauciones e instrucciones de uso.
- Puede causar ligera irritación si el producto entra en contacto con la piel u ojos. No ingerir.
- Evitar el contacto e inhalación de la deriva durante la aplicación del producto. Si el producto es mezclado con pesticidas y/o adyuvantes, seguir todas las precauciones de la etiqueta del pesticida y/o adyuvante.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, recibir atención médica. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos por lo menos. Si la irritación persiste, pedir asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Recibir atención médica. Si existiera contacto con una solución mezclada con un pesticida, seguir las recomendaciones del pesticida en uso.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE

No contaminar los ríos, estanques o depósitos de agua al lavar el equipo de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Guárdese bajo llave y lejos de alimentos, granos, semillas y forrajes.
- Manténgase en un lugar fresco, seco, y bien ventilado.
- En caso de derrames, recoger el producto.
- No se transporte junto con productos alimenticios, ropa, semillas, forrajes y fertilizantes.
- Asegure el producto durante su transporte.

CUIDADO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS