

# FOBOS<sup>®</sup> 50 WP

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE – WP**

**Composición Química:**

Iprodione.....500 g/kg  
Aditivos.....c.s.p. ..1 kg

**Reg. PQUA N° 522 – SENASA**

**Titular de Registro:  
MONTANA S.A.**

**Fabricado y Formulado por:**



**Willowood Limited**  
17 Floor, Seaview Plaza,  
No.283- Shau Kei Wan Road,  
Hong Kong.

**Importado y Distribuido por:  
MONTANA S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210  
Ofi. 401, La Molina. Lima -Perú.  
Teléfonos: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com

**Contenido Neto: 1 Kg**

Lote N°:  
Fecha de Fab.: **RECUADRO SIN BARNIZ  
(NO IRA IMPRESO)**  
Fecha de Exp.:



**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación moderada a los ojos. Evite la exposición.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos, bien ventilados y bajo llave.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: Lavar los residuos remanentes de la boca y trasladar al intoxicado a un centro de salud.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en un lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. No existe antídoto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**ESSALUD: 117**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040**

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FOBOS® 50 WP** es un fungicida de contacto y con capacidad de ingresar al tejido foliar pero sin presentar un movimiento sistémico. Sobre el hongo impide la germinación de las esporas, inhibe el crecimiento del micelio y la producción de órganos reproductores de esporas.

**FOBOS® 50 WP** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o  $\frac{3}{4}$  partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre el área foliar, flores y frutos.
- Se recomienda dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones y rotar con fungicidas con diferente mecanismo de acción (diferentes grupos químicos).

### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

**FOBOS® 50 WP** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD

**FOBOS® 50 WP** no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

### CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS (g/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	14	10
Palto	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Alcachofa	Podredumbre/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Mandarina	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300 - 400	30	1
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500 - 600	7	0.2

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

