

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
FEBRERO 2020
AG

PANTONE ORANGE 021 C

PANTONE 293 C

PANTONE PROCESS BLACK PC

Induce

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Papa	0.5 - 1	1 - 3	Aplicar al suelo "Drench" durante la siembra y/o 7 días después de la emergencia. Repetir cada 15 días si fuese necesario.
Cebolla, Ajo y Kion			Aplicar a los 7 días después del trasplante. Repetir a los 14 días si fuese necesario.
Hortalizas de Hoja			Aplicar después del trasplante. Repetir a los 7 días si fuese necesario.
Alverja Holantao, Frijol y Vainita			Aplicar a partir de los 10 días de la siembra hasta la floración y luego a la aparición de primeras vainas.
Pepinillo, Zapallo y Calgua			Aplicar a los 10 días después de la emergencia. Repetir a los 15 días si fuese necesario.
Granadilla y Maracuyá			Aplicar al suelo "drench" después del trasplante y repetir cada 30 días si fuese necesario.
Fresa, Berries y Piña			Aplicar después del trasplante. Repetir a los 7 ó 15 días si fuese necesario.
Tomate Pimiento y Ajies			Aplicar al suelo "Drench" durante la siembra y/o a los 7 días después del trasplante. Repetir a los 15 ó 30 días si fuese necesario.
Alcachofa			Aplicar después del trasplante. Repetir a los 7 ó 15 días si fuese necesario.
Espárrago			2.5 - 5
Palto y Mango	Aplicar en pleno brotamiento, en la formación del racimo y durante el envero.		
Uva de mesa y vinífera	Aplicar durante la prefloración y el inicio del brotamiento. Repetir la aplicación durante el crecimiento y la maduración del fruto.		
Mandarina, Limón y Lima	Aplicar durante la prefloración y el inicio del brotamiento. Repetir la aplicación durante el crecimiento y la maduración del fruto.		
Manzano y Melocotón			Aplicar en pleno brotamiento y después del cuajado.

Importante: En fertirrigación, las dosis pueden cambiar conforme a la necesidad del cultivo en cada una de las fases de desarrollo.

CONSIDERACIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN

- Agite bien el envase antes de usar y coloque el agua en el tanque hasta la mitad.
- Agregue la cantidad necesaria de **INDUCE**, previamente diluida en forma homogénea y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.
- Prepare la solución de **INDUCE** el mismo día de la aplicación.
- No almacene el producto diluido en agua.

Fosfito de Potasio Reforzado

Composición (p/v):

Fósforo (P ₂ O ₅)	30 %
Potasio (K ₂ O)	20 %
Aditivos Conservantes	3 %

Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210, Oficina 401, La Molina, Lima - Perú
Servicio de atención al cliente: (511) 419 3000
www.corpmontana.com

Lote:

Fecha de Form:
Fecha de Venc:

RECUADRO SIN BARNIZ
(NO IRA IMPRESO)

Cont. Net. 1L

MONTANA

CUIDADO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



GENERALIDADES

INDUCE es un fertilizante mineral que actúa como un activador de la resistencia vegetal, logrando que sus componentes activos ejerzan una acción sinérgica para la inducción y producción de ciertos mecanismos de defensa que permitan prevenir y amortiguar el daño ocasionado por las enfermedades en los cultivos.

INDUCE es rápidamente absorbido a través de los órganos de la planta y puede ser utilizado en pulverizaciones foliares, al cuello de planta (drench) e inyectado a través del sistema de riego por goteo.

Ventajas del uso de **INDUCE**

- Alta estabilidad y persistencia dentro de la planta.
- Refuerza y mejora la acción de los fungicidas.
- No causa fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

INDUCE es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

PRECAUCIONES

- Antes de usar este producto, leer las precauciones e instrucciones de uso.
- Puede causar ligera irritación si el producto entra en contacto con la piel u ojos.
- No ingerir y evitar el contacto e inhalación de la deriva durante la aplicación del producto. Si el producto es mezclado con pesticidas y/o adyuvantes, seguir todas las precauciones de la etiqueta del pesticida y/o adyuvante.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, se deberá recibir atención médica inmediata, pero en ningún caso se deberá inducir al vómito. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos por lo menos. Si la irritación persiste, pedir asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Recibir atención médica. Si existiera contacto con una solución mezclada con un pesticida, seguir las recomendaciones del pesticida en uso.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

No contaminar los ríos, estanques o depósitos de agua al lavar el equipo de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Guárdese bajo llave y lejos de alimentos, granos, semillas y forrajes.
- Manténgase en un lugar fresco, seco, y bien ventilado.
- En caso de derrames, recoger el producto.
- No se transporte junto con productos alimenticios, ropa, semillas, forrajes y fertilizantes.
- Asegure el producto durante su transporte.