AVISO CONSEJOS

PRODUCTO	Tolprox 5%	**MATERIAL**	PVC
P. GRÁFICA	Tolprox 5% 1 Litro	**TROQUEL**	.
MEDIDAS	10.5 cm x 8.5 cm aprox	**COLORES**	Cuatricomía
FECHA MOD.	25.09.19	**ACABADO**	- Serigrafía
RESPONSABLE	Kevin Aguirre		
RUTA	G:\Montana\Sanivet\Tolprox 5%\Tolprox 5% Etiqueta Editable\Tolprox 5% 1 Litro Etiqueta Editable		

C=84 Y=0 M=30 K=0

C=27 Y=100 M=0 K=0

C=100 Y=0 M=87 K=0

C=0 Y=0 M=0 K=100

C=0 Y=100 M=60 K=0

Color de tapa: PANTONE 288 C

APROBADO
Por Ethel Aoun fecha 16:20 , 03/10/2019

TOLPROX® 5%

Anticoccidial de amplio espectro

USO VETERINARIO

MONTANA

CONTENIDO NETO
1 Litro

TOLPROX® 5%

Anticoccidial de amplio espectro

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:

Toltrazuril	5 g
Vehículo c.s.p.	100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA

TOLPROX® 5% es un anticoccidial de amplio espectro, efectivo para el tratamiento y control de la coccidiosis en terneros y lechones, ejerciendo un efecto anticoccidial en todos los estadios de desarrollo intracelular, como son la esquizogonia y la gametogonia. TOLPROX® 5% no altera la capacidad de lechones y terneros para adquirir inmunidad de por vida contra los coccidios, favoreciendo así la resistencia a la reinfección.

INDICACIONES DE USO

TOLPROX® 5% actúa para el tratamiento y control de las principales coccidias de bovinos y porcinos, tales como: *Eimeria bovis*, *Eimeria zuernii* y *Eimeria alabamensis* en bovinos y por *Isospora suis* en porcinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Se administra por vía oral en forma individual utilizándose una jeringa dosificadora:

- LECHONES: 0.5 ml por kg de peso vivo (equivalente a 25 mg/kg de peso vivo) como única dosis, entre los 2 a 5 días de edad. Puede repetirse la dosificación luego del destete.
- TERNEROS: 3 ml por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 15 mg/kg de peso vivo) como única dosis, antes de que aparezcan los primeros signos de la parasitosis.

RECOMENDACIÓN

- Si produjera vómito repetir la dosificación.

PRECAUCIONES EN EL ANIMAL

- Evitar "falsa deglución" durante la administración.
- No debe administrarse en hembras gestantes o lactantes.

PRECAUCIONES EN EL HOMBRE

- En caso que el producto entre en contacto directo con las manos u ojos del manipulador, lavar el área con agua y jabón.

PERIODO DE RETIRO

Bovinos y porcinos: 70 días.

USO VETERINARIO.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. CONSERVAR EL PRODUCTO EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO, ENTRE 15 °C Y 30 °C. VENTA BAJO RECETA MÉDICA. AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE USAR.

Lote:

F. de Elaboración:

F. de Expiración:

PRODUCTO PERUANO
Fabricado y Distribuido por MONTANA S.A.
R.U.C. 20100182263
Av. Javier Prado Este N° 6210, of. 401, Lima 12, Perú.
Central telefónica: (511) 419-3000
www.corpmontana.com
Prof. Responsable: M.V. Silvia Melgar Segovia
Reg. SENASA N°: F64.53.N.0031
Importador y Distribuidor en Bolivia: BIOPAZ S.R.L.
Calle Marcelo Quiroga Santa Cruz N° 3705 El Alto, La Paz - Bolivia.
Telf.: (591) 2 282-0171/ (591) 2 282-9063
Reg. SENASAG PUV F N°: 004804/11
Importador y Distribuidor en Ecuador:
MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A.
Sebastián Moreno E1-73 y Pan. Norte Km 6 ½ - Quito, Ecuador
Telf.: (593) 2 2480 128 / (593) 2 2800 076
Reg. N°: 2C1- 13206-AGROCALIDAD
Importador y Distribuidor en Guatemala: GENÉTICA S.A.
Calzada La Paz, 0 calle 23-13, Zona 17. Centro de Negocios La Paz Bodega, #107. Ciudad de Guatemala – Guatemala
Telf. (502) 2374 6400
Reg. MAGA: N°: PE130-42-17-7569
Importador y Distribuidor en Honduras:
Pecuaria Hondureña S.A. de C.V.
Barrio Paz Barahona 9 avenida entre 13 y 14 calle al SO.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Telf.: (504) 25570152
Reg. N°: PF-5319
Nicaragua: Reg. N°:10069
Panamá: Reg. N°: RF-6422-13