FRIPETS® PUPPY

Hoja Técnica

Fecha: 22/09/2020
Versión: 01
Elaborado por: KB
Aprobado por: JT

1. DENOMINACIÓN:	**FRIPETS® PUPPY** es un antiparasitario interno. Combina cuatro principios activos eficaces y seguros que le confiere un amplio espectro en infestaciones parasitarias.
2. COMPOSICIÓN:	Cada 100,0 g de FRIPETS® PUPPY contiene: Pamoato de pirantel 7,25 g Pamoato de oxantel 7,00 g Oxibendazol 7,50 g Praziquantel 2,50 g Excipientes c.s.p. 100,0 g
3. FORMA FARMACÉUTICA:	Pasta oral.
4. DATOS CLÍNICOS:	
4.1. Especie de Destino	Caninos y felinos.
4.2. Indicaciones de uso	**FRIPETS® PUPPY** está indicado para eliminar las infestaciones por nemátodos, céstodos y giardias que afectan a caninos y felinos, tales como: *Toxocara canis, Toxocara cati, Ancylostoma caninum, Dipylidium* sp., *Aelurostrongylus abstrusus, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia multiceps, Taenia taeniformis, Taenia pisciformis, Taenia ovis y Giardia* sp.
4.3. Contraindicaciones	No utilizar en especies no indicadas. No exceder la dosis recomendada. No administrar en cachorros menores de 4 semanas.
4.4. Precauciones especiales de uso	Proteger el envase de daños físicos. Se debe utilizar con cuidado en animales con enfermedad hepática, mala nutrición, deshidratados, débiles o con anemia.
4.4.1.Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales	
Emplear las normas de seguridad mínimas (uso de mascarilla, guantes, etc.). Evitar contacto directo del producto con las vías respiratorias del operario, ojos y piel. Si se produce contacto accidental con los ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Lavarse las manos minuciosamente luego de manipular el producto. Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente.	
4.5. Reacciones adversas	La administración junto con levamisol, organofosforados o carbamicina, puede ocasionar cierto grado de toxicidad. No administrar junto con piperazina debido a que ambos poseen efectos antagónicos.
4.6. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción	
No se han reportado.	
4.7. Posología y modo de administración	Administración vía oral.
• **Caninos y felinos:**	Administrar a razón de 1 mL de FRIPETS® PUPPY por cada 5 kg de peso vivo (equivalente a 5,0 mg de pamoato de pirantel, 5,0 mg de pamoato de oxantel, 15,0 mg de oxibendazol y 5,0 mg de

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de Gestión de Calidad – Montana S.A.
Copias electrónicas son permitidas sin firmas sólo en el Portal de Información Técnica y una vez impresas son consideradas copias no controladas.

	praziquantel por kg de peso vivo) en caninos y felinos a partir de las 4 semanas de edad. Se recomienda repetir las dosis según indicación de su médico veterinario.
4.8. Sobredosis	Más de 5 veces la dosis recomendada puede evidenciar signos de toxicidad.
4.9. Periodo de retiro	Este producto no lo requiere.
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:	
5.1. Mecanismo de acción	
El pirantel y oxantel (en forma de pamoato) ejercen su acción antiparasitaria exclusivamente sobre nemátodos gastrointestinales adultos, mediante un efecto colinérgico, despolarizando la placa neuromuscular del parásito y produciéndole una parálisis espásmica. El oxibendazol inhibe los mecanismos de asimilación de glucosa y de producción energética parasitaria. Además, interfiere en el transporte intracelular provocando degeneración del parasito. Su baja solubilidad aumenta su acción farmacológica, ya que se produce un contacto más prolongado entre el principio activo y el parásito. El praziquantel penetra en el parásito, afectando la membrana tegumentaria y trastornando los procesos regulatorios como el incremento de la permeabilidad del calcio e inhibición de la captación de glucosa. Promueve el desarrollo de contracciones sucesivas y el consumo de sus reservas energéticas, lo cual deriva en la parálisis espástica de la musculatura del parásito y su posterior muerte. Asimismo, al interferir sobre la regulación de la concentración de Ca^{+2} intracelular, genera modificaciones sobre la motilidad y adhesión del parásito.	
6. DATOS FARMACEUTICOS:	
6.1. Incompatibilidades	No se han reportado.
6.2. Tiempo de vida útil	24 meses.
6.3. Precauciones de almacenamiento	Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15 ºC y 30 ºC. Mantener el empaque cerrado cuando no esté en uso. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
6.4. Naturaleza y presentación del envase	Jeringa por 3mL y 5 mL.
6.5. Precauciones especiales para la eliminación del producto no utilizado o productos de desecho	Cualquier producto veterinario no utilizado o material desechado procedente del producto debe ser destruido de acuerdo con las normativas locales de manejo de residuos.
7. Reg. SENASA N°:	

La información contenida en este documento es considerada confiable. Sin embargo, se provee esta información sin ninguna garantía expresa o implícita de su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenaje, uso o eliminación de este material están fuera de nuestro control; por lo tanto, no asumimos la responsabilidad en casos de daño, pérdida o gastos relacionados con tales actividades.
Este documento ha sido elaborado y debe ser usado para este material. Si el material es usado como ingrediente en otro producto, esta información no será aplicable para el producto resultante. Esta información no constituye una especificación técnica.

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de Gestión de Calidad – Montana S.A.
Copias electrónicas son permitidas sin firmas sólo en el Portal de Información Técnica y una vez impresas son consideradas copias no controladas.